

# CORONA-IMPFSTOFFE IM ÜBERBLICK

Impfempfehlung nach Alter				Impfempfehlung besondere Gruppen			
Grundimmunisierung	12-29 Jahre	30-59 Jahre	> 60 Jahre	Schwangere	Stillende	Menschen mit Immunschwäche	Infizierte/Genesene
Mögliche Impfstoffe nach STIKO	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	Ab 2. Trimenon mit <b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen Sonderfall: 1. Dosis -> Schwangerschaft -> 2. Dosis ab 2. Trimenon	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	<b>12-29 Jahre:</b> <b>mRNA Biontech/Pfizer</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen 3. Dosis (s. Auffrischung)	<b>1 Impfdosis, Infektion &lt; 4 Wochen nach Impfung:</b> bei PCR-Nachweis 1 Dosis 6 Monate nach Infektion; bei serologischem Nachweis 1 Dosis im Abstand von 4 Wochen zur Labordiagnose <b>1 Impfdosis, Infektion ≥ 4 Wochen nach Impfung:</b> keine weitere Dosis zur Grundimmunisierung nötig
	<b>mRNA Moderna:</b> 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen	<b>mRNA Moderna:</b> 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen		<b>mRNA Moderna</b> (nur ab 30 Jahren empfohlen): 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen	<b>&gt; 30 Jahre:</b> <b>mRNA Biontech/Pfizer</b> 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen oder <b>mRNA Moderna</b> 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen 3. Dosis (s. Auffrischung)		<b>2 Impfstoffdosen, danach SARS-CoV2-Infektion:</b> keine weitere Dosis zur Grundimmunisierung nötig
	<b>Vektorimpfstoff Astra zeneca:</b> STIKO rät: 1. Dosis Astra zeneca; 2. Dosis mRNA, Abstand 4 Wochen						<b>SARS-CoV-2-Infektion, PCR-Nachweis:</b> 1 Dosis 6 Monate nach Infektion; <b>SARS-CoV-2-Infektion, serologischer Nachweis:</b> 1 Dosis im Abstand von 4 Wochen zur Labordiagnose
	<b>Vektorimpfstoff Johnson&amp;Johnson:</b> Einmaldosis STIKO rät: <b>Auffrischung mit mRNA</b> , Abstand 4 Wochen						<b>SARS-CoV-2-Infektion, danach bereits geimpft (G.o.):</b> keine weitere Dosis zur Grundimmunisierung nötig
Auffrischung			≥ 18 Jahre	<b>Schwangere</b> (selbst wenn doppelt geimpft)	<b>Pflegebedürftige</b>	<b>Menschen mit Immunschwäche</b> (3. Dosis zählt als Grundimmunisierung)	<b>Infizierte/Genesene</b>
STIKO: möglichst mit gleichem mRNA wie Grundimmunisierung  <b>Auffrischung nach Grundimmunisierung &gt; 6 Monate für alle möglich; aber Gefährdete (s. rechts) haben Priorität. Bisher Ungeimpfte sollen vorrangig geimpft werden.</b>				<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1 Dosis, Abstand 6 Monate	<b>1 Dosis mRNA Biontech/Pfizer</b> ab dem 2. Trimenon	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1 Dosis, Abstand 6 Monate	<b>≥ 18 Jahre, immungesund:</b> 1 Dosis mRNA Biontech/Pfizer, Abstand 6 Monate (zu vorheriger Impfdosis oder Infektion)
				<b>mRNA Moderna:</b> 0,5 Dosis (= 0,25 ml), Abstand 6 Monate		<b>mRNA Moderna:</b> 0,5 Dosis (= 0,25 ml), Abstand 6 Monate	<b>≥ 18 Jahre, immungesund:</b> 1 Dosis mRNA Biontech/Pfizer oder 0,5 Dosis mRNA Moderna (= 0,25 ml) jeweils Abstand 6 Monate (zu vorheriger Impfdosis oder Infektion)
						<b>&gt; 30 Jahre: 3. Dosis mRNA Biontech/Pfizer, Abstand 6 Monate (schwere Immunschwäche: Abstand 4 Wochen) oder 3. Dosis mRNA Moderna, Cave: ganze Dosis = 0,5 ml; Abstand 6 Monate (schwere Immunschwäche: Abstand 4 Wochen)</b>	<b>mRNA Moderna:</b> 0,5 Dosis (= 0,25 ml), Abstand 6 Monate